Arkivfoto: Norsk Landbruk

2020 er det internasjonale plantehelseåret

FN har utnevnt 2020 til det internasjonale plantehelseåret. I Norge skal NIBIO lede planlegginga av norske markeringer av Plantehelseåret 2020. Markeringene skal vise hvor viktig god plantehelse er for matsikkerhet, mattrygghet og bærekraftig landbruksproduksjon.

Illustrasjonsfoto: Bethi Dirdal Jåtun

EU-innfører hastetiltak mot tomat-virus

Tomatbrunflekkvirus er svært smittsomt og kan gjøre stor skade i produksjonen. Fra november 2019 innførte EU hastetiltak for å hindre innførsel og spredning av tomatbrunflekkvirus, skriver Norsk Landbruksrådgiving.

Vedtaket sier at planter kan flyttes innenfor EU dersom det følger med et plantepass, og hvis plantene kommer fra områder hvor tomatbrunflekkvirus ikke forekommer.

I EU er viruset regnet som en karantenteskadegjører. Det er det ikke i Norge. Men da det var mistanke om angrep av tomatbrunflekkvirus i et forsøk ved NMBU på Ås sist høst, ble plantene destruerte.

For innførsel av tomatfrø og tomatplanter til Norge er det krav til plantesunnhetssertifikat, skriver Landbruksrådgivinga.

Arkivfoto: Norsk Landbruk

OMDISPONERING: Størst arealendring har det vært i de såkalte kornområdene, hvor en del kornareal har blitt erstattet med grasproduksjon.

Mer gras og mindre korn i kornområdene

Rapport tar for seg endringene i arealbruk i Norge mellom 2004 og 2018. Der kommer det fram at totalt jordbruksareal har blitt redusert med 5,2 prosent i denne perioden.

TEKST: Kristin Bergo, kristin@norsklandbruk.no

AREALBRUK Rapporten, som er publisert av Agri Analyse, ser på arealendringene fordelt på de sju arealtilskuddssonene. Mellom 2004 og 2018 har totalt kornareal blitt redusert med 14 prosent, fra 3,4 millioner til 2,9 millioner dekar. Størst reduksjon er det i sone 7, som omfatter Finnmark og deler av Troms. Der er kornarealene redusert med 70 prosent på 14 år, til skarve 49 dekar i 2018.

I 2018 STO SONENE 1 OG 3, som omfatter store deler av Østlandet, for 81 prosent av kornarealet. I disse to sonene har kornarealet blitt redusert med til sammen 343 000 dekar siden 2004. Dette vil si at sone 1 nå har 12 prosent mindre kornareal enn for 15 år siden, mens sone 2 har fått 14 prosent mindre kornareal.

Samtidig har det totale grasarealet i landet økt med én prosent. Størst er økninga i sone 1, som har gått fra rundt 350 000 til omtrent 442 000 dekar med gras siden 2004. Dette er en økning på 26 prosent. Nest størst økning har sone 3, med 22 prosent. Sone 1 og 3 har til sammen derfor en økning i grasareal på 216 000 dekar. Bortsett fra sone 2 og 5A, som har liten eller ingen økning, har alle de resterende sonene en reduksjon i grasarealet.

IFØLGE RAPPORTEN er reduksjonen i kornareal nesten like stor som reduksjonen i totalt jordbruksareal. I de såkalte kornområdene, hovedsakelig i sone 1 og 3, blir reduksjonen i kornareal delvis erstattet med grasproduksjon. Dette vil si at det nå dyrkes gras på 56 prosent av det reduserte kornarealet i sone 1, og tilsvarende 70 prosent for sone 3.

Rapporten tar også for seg endring i antall mordyr av storfe og sau siden 2004. Det kommer fram at det har vært en nedgang i antall melkekyr i alle arealtilskuddssonene i perioden, mens det derimot har blitt flere ammekyr i hele landet. For mordyr av sau har det vært en økning i alle soner, med unntak av i sone 7.

Det er Torbjørn Tufte og Astrid Een Thuen som har skrevet rapporten. ■